

Liječenje tuberkuloze

Na početku ste liječenja tuberkuloze (TB) koje će trajati od šest do devet mjeseci. (Ponekad ovo liječenje može potrajati i duže.)

Lijekovi protiv tuberkuloze

Bilo koji lijek može prouzrokovati nuzgredne posljedice, uključivši i lijekove protiv tuberkuloze. Rabite sve lijekove po uputstvima vašeg liječnika. Vaš liječnik će pratiti djelovanje svih lijekova propisanih za liječenje vaše tuberkuloze. Ako dođe do nuzgrednih posljedica, to trebate odmah prijaviti vašem liječniku.

Neke nuzgredne posljedice na koje morate paziti kada rabite lijekove protiv tuberkuloze su:

- Stalan svrbež
- Poremećaji sa stomakom, mučnina i gubitak apetita
- Trnci, neosjetljivost ili bockanje u rukama i stopalima
- Osip, modrice ili požutjela koža.
- Zamagljen vid.
- Mokraća tamne boje i/ili
- Požutjele oči

Slijedeći lijekovi se rabe u liječenju tuberkuloze i svi su u obliku tableta:

TABLETE ISONIAZID

Tablete isoniazid mogu vas napraviti da se osjećate umornim, mogu prouzrokovati mučninu ili gubitak apetita i, rijeđe, neosjetljivost ili bockanje u vašim rukama i stopalima.

TABLETE RIFAMPICIN

Tablete rifampicin mogu smanjiti djelotvornost pilule za kontracepciju. Zđene koje upotrebljavaju pilule za kontracepciju trebaju to dati na znanje svom liječniku prije nego počnu upotrebljavati tablete rifampicin. Možda ćete trebati razgovarati sa svojim liječnikom ili Klinikom za obiteljsko planiranje (Family Planning Clinic) o drugim oblicima sprečavanja začeća.

Ako imate usađene leće za vid ili ako nosite kontakt leće, obavijestite o tome svog liječnika, jer ih ovaj lijek može umrljati.

Tablete rifampicin će dati ružičastu boju vašoj mokraći, pljuvački i znoju, ali vas to ne treba zabrinjavati.

TABLETE ETHAMBUTOL ILI MYAMBUTOL

Iako će u klinici koju posjećujete redovito pregledavati vaš vid, trebate odmah informirati vašeg liječnika a to počmete imati bilo kakvog problema sa

vidom. Također trebate prestati rabiti lijek protiv tuberkuloze, dok vam vaš liječnik ne odredi drukčije.

TABLETE PYRAZINAMIDE

Tablete pyrazinamide mogu vam stvoriti mučninu i prouzrokovati gubitak apetita. Ovaj lijek se obično rabi samo za vrijeme prva dva ili tri mjeseca liječenja. Odmah prijavite vašem liječniku bilo kakve neobjasnjive bolove, groznicu ili osip.

LIJEKOVE RABITE REDOVITO

Važno je da sve lijekove rabite po uputama vašeg liječnika. Neredovito uzimanje lijekova može prouzrokovati ozbiljne reakcije i pojavu otpornosti na lijek. Ne pijte alkohol jer to može povećati toksičnost lijeka i prouzročiti nuzgredne posljedice.

PRETRAGE ZA VRIJEME LIJECENJA

Vaš liječnik može sa vremena na vrijeme zatražiti analizu krvi, da bi utvrdio da li lijekovi uspješno liječe vašu tuberkulozu.

Druge pretrage, kao što su analize pljuvačke i mokraće, mogu se također izvršiti da se provjeri napredovanje liječenja.

Trebate li više podataka ?

Za daljnje obavijesti kontaktirajte:

TB Program
Disease Control Section
Department of Human Services
GPO Box 1670N
Melbourne 3001

Brzoglas: (03) 9637 4115

Izdao –Infectious Diseases Unit, Public Health Branch, Department of Human Services.

Ove informacije se temelje na najsvježijim podacima koji su na raspolaganju od mjeseca siječnja 1998. godine.

Dizajn i proizvodnja –Human Services Communications Unit.

Dostupno na Internetu pod –
<http://hna.ffh.vic.gov.au>